


PLAN DE CUIDADO HISTERECTOMÍA


EL UTERO

El útero o matriz es un órgano muscular hueco que se ubica en la pelvis femenina, entre la vejiga y el recto. Los ovarios producen los óvulos, que se desplazan a través de las trompas de Falopio. La principal función del útero es la de crear las condiciones propicias para que se implante el embrión y se desarrolle de forma correcta.






Los tipos de histerectomía incluyen:



Histerectomía subtotal:

Consiste en la extirpación de la parte superior del útero, el cuello uterino y los ovarios se dejan intactos.




Histerectomía total.

Consiste en la extirpación del útero completo y el cuello uterino, pero no los ovarios.

Salpingoooforectomía


Unilateral

En la cual se extirpan el útero, uno de los ovarios y una de las trompas de Falopio



Bilateral


Por la que se extirpan el útero, ambos ovarios y ambas trompas de Falopio






Histerectomía radical.

Consiste en la extirpación del útero, el cuello uterino, ovarios, trompa de falopio y vagina este procedimiento es realizado por el ginecólogo oncológico



HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Definición

La histerectomía abdominal es una operación que permite extirpar el útero a través de un corte en la parte inferior del vientre.





Alimentación

- Comer normalmente
- Consumir abundantes líquidos para que las deposiciones sean blandas y el esfuerzo sea mínimo
- Suprimir el consumo de leche los primeros días para evitar la distensión abdominal y los gases, así como granos (frijoles, alverjas, garbanzos, lentejas, alimentos irritantes, picantes)

No consumir bebidas alcoholicas

Signos de alarma después del procedimiento

- Fiebre mayor a 38°C
- Dolor que no cede con el medicamento prescrito
- Diarrea durante los diez primeros días después de la operación
- Sangrado vaginal abundante o con mal olor
- Dolor de cabeza
- Vómito frecuente, mareos y/o nauseas
- Pus o apertura de los puntos de herida
- Rubor, calor, edema, enrojecimiento de la herida






HISTERECTOMIA LAPAROSCÓPICA


Definición

Consiste en la extirpación total o parcial del útero y tejidos anexos afectados de patología severa (benigna o maligna), sin necesidad de abrir el abdomen. Luego de realizar los pequeños cortes, se extrae el útero a través de la vagina





Cirugía Abierta



Incisión



Cuidados en el hogar histerectomía abdominal y laparoscópica

- Intente caminar todos los días.
- Comience caminando un poco más de lo que caminó el día anterior.
- Evite levantar objetos que pudieran implicar un esfuerzo

• Evite actividades intensas, como montar en bicicleta, moto, trotar, levantar pesas o hacer ejercicios aeróbicos, hasta que su mádico lo grando de la grando de

médico lo apruebe.

- Evite tener relaciones sexuales durante los primeros 3 meses post operatorio.
- Debe ducharse todos los días.
 Seque la herida con toques suaves.
- Puede continuar con su alimentación según lo indicado
- Beba abundantes líquidos
- Administración de medicamentos según prescripción medica (analgésicos, antibióticos, anticoagulante)





Alimentación

- Comer normalmente
- Consumir abundantes líquidos para que las deposiciones sean blandas y el esfuerzo sea mínimo
- Suprimir el consumo de leche los primeros días para evitar la distensión abdominal y los gases, así como granos (frijoles, alverjas, garbanzos, lentejas, alimentos irritantes, picantes)
- No consumir bebidas alcoholicas

SIGNOS DE ALARMA
DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

- Fiebre mayor a 38°C
- Dolor que no cede con el medicamento prescrito
- Diarrea durante los diez primeros días después de la operación
- Dolor de cabeza
- Vómito frecuente, mareos y/o nauseas
- Rubor, calor, edema, enrojecimiento de la herida
- Pus o apertura de los puntos de herida






HISTERECTOMÍA VAGINAL

Definición

histerectomía vaginal es un procedimiento quirúrgico para extirpar el útero a través de la vagina.



ÚTERO



SINTOMAS

- Ver o sentir un bulto de tejido que sobresale de la vagina
- Sensación de pesadez o de tirón en la pelvis
- Sentir que la vejiga no se vacía del todo cuando va al baño
- Incontinencia urinaria
- Sensación de estar sentada sobre una pelota pequeña
- Sensación de que el tejido vaginal roza con la ropa interior
- Presión o molestia en la pelvis
- Sensación que el tejido vaginal está suelto

CUIDADOS EN EL HOGAR

- Descanse en casa después de la cirugía.
- Tome todos los medicamentos recetados analgésicos, anticoagulantes, antibióticos, etc.
- Los puntos que se encuentran dentro de la vagina se absorberán con el tiempo. No es necesario quitarlos.
- Usar toallas sanitarias y cambiarlas las veces que sean necesarias
- Bañarse normalmente, con agua y jabón, realizar aseo estricto de sus órganos genitales todos los días





CUIDADOS EN EL HOGAR

- No tome baños de asiento durante las primeras 2 semanas o hasta que su médico lo apruebe.
- Realiza caminatas cortas por la habitación y poco a poco auméntelas
- Evitar esfuerzos bruscos y alzar objetos pesados
- Evite tener relaciones sexuales durante los primeros 3 meses post operatorio.



Aimentación

- Comer normalmente
- Consumir abundantes líquidos para que las deposiciones sean blandas y el esfuerzo sea mínimo
- Suprimir el consumo de leche los primeros días para evitar la distensión abdominal y los gases, así como granos (frijoles, alverjas, garbanzos, lentejas, alimentos irritantes, picantes)
- No consumir bebidas alcoholicas



SIGNOS DE ALARMA DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

- Fiebre mayor a 38°C
- Diarrea durante los diez primeros días después de la operación
- Sangrado vaginal abundante o con mal olor
- Dolor que no cede con el medicamento prescrito
- Vómito frecuente
- Mareos
- Nauseas
- Dolor de cabeza

¿POR QUE SE REALIZA UNA HISTERECTOMÍA?

Podrías necesitar someterte a una histerectomía para tratar lo siguiente:


Cáncer. Si tienes cáncer de útero o de cuello del útero, una histerectomía puede ser la mejor opción de tratamiento.

Sangrado vaginal intenso e irregular: Cuando el sangrado no se puede controlar con otros métodos.



¿POR QUE SE REALIZA UNA HISTERECTOMÍA?

Prolapso uterino: Cuando los músculos y los ligamentos del suelo pélvico se estiran y se debilitan, el útero puede carecer de sostén suficiente para mantenerse en su lugar.




ACTIVIDAD RECOMENDADA

La recuperación total puede tardar de 4 a 6 semanas. Puede ser diferente de una mujer a otra.

- Bañese todos los días y evite relaciones sexuales los primeros 3 meses
- Asista a sus citas de control según la indicación y recuerde llevar el resultado de la patología a la cita con el ginecólogo.



RETIRO DE PUNTOS





- Incisión tipo pfannestiel: Retiro de puntos en 10 días
- Incisión mediana infraumbilical: Retiro de puntos en 15 días En la histerectomia laparoscópica 3 o 5 incisiones pequeñas en el abdomen. Se insertaron un laparoscopio (un tubo delgado con una cámara pequeña)

COMPLICACIONES

La histerectomía suele ser segura; sin embargo, como toda cirugía mayor, presenta el riesgo de complicaciones.

- Infección Sangrado abundante.
- Coágulos sanguineos.
- Daño durante la cirugía de estructuras pélvicas.
- Incontinencia o retención urinaria.
- Una mala reacción a la anestesia



Pds Ginecobstetricia, pediatría y consulta externa 2023-1